

124151-02

BOVELA™

Vacina contra diarreia viral bovina tipo 1 e tipo 2.

Para uso em bovinos
Uso veterinário

Composição

Cada dose de 2 mL contém:

Vírus vivo modificado da diarreia viral bovina Tipo 1, não citopático, cepa parental KE-9

Mínimo: $1 \times 10^{4,0}$ TCID₅₀

Máximo: $1 \times 10^{6,0}$ TCID₅₀

Vírus vivo modificado da diarreia viral bovina Tipo 2, não citopático, cepa parental NY-93

Mínimo: $1 \times 10^{4,0}$ TCID₅₀

Máximo: $1 \times 10^{6,0}$ TCID₅₀

Indicações

Para imunização ativa de vacas prenhes contra o vírus da diarreia viral bovina (BVDV-1 e BVDV-2) para a prevenção da infecção transplacentária do feto.

Para imunização ativa de bovinos a partir de 3 meses de idade para redução dos sinais clínicos, disseminação do vírus, viremia e para minimizar a redução de contagem de leucócitos causada pelo vírus BVDV.

Posologia e modo de usar

Recomendado para o programa de vacinação. Após a reconstituição com o diluente que acompanha o produto, administrar uma dose (2 mL) de vacina pela via intramuscular em bovinos a partir de 3 meses de idade, independente do peso corporal.

É recomendável a vacinação de todo o rebanho no mesmo dia a fim de reduzir a prevalência do vírus na população de gado. A revacinação é recomendada após 1 ano.

Reconstituir a fração liofilizada adicionando todo o conteúdo do diluente. Antes do uso assegure-se de que todo liofilizado está completamente reconstituído.

A vacina reconstituída é transparente e incolor. Evitar múltiplas inserções da seringa na tampa do frasco.

Início da imunidade: 3 semanas depois da vacinação. Duração da imunidade: 1 ano.

Recomendações

A vacina pode ser utilizada em animais prenhes e lactantes. Vacinar apenas animais saudáveis.

Contra indicação

Não utilizar em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou qualquer outro excipiente da vacina.



Precauções

Armazenar em temperaturas entre 2°C a 8°C. Não congelar. Prazo de validade após a reconstituição da vacina: 8 horas em temperatura ambiente.

Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Não utilizar após a data de validade descrita no cartucho e nos frascos.

Manter os frascos das vacinas nas embalagens originais.

A vacina não foi testada em touros reprodutores.

Período de carência: zero dias.

Precauções a serem tomadas pelas pessoas que administram a vacina: nenhuma.

Não administrar junto com outros produtos veterinários, exceto ao diluente desta vacina.

Informações com relação à segurança e eficácia desta vacina quando utilizada com outro produto de uso veterinário não estão disponíveis. A decisão quanto ao uso desta vacina antes ou depois de qualquer outro produto deve ser analisada caso a caso. As embalagens dos produtos devem ser descartadas de maneira apropriada, de acordo com as normas ambientais legais.

Reações adversas

Um leve aumento de temperatura corporal até 39,5°C pode ocorrer após a administração de 10 vezes a dose indicada.

Em raros casos foram observados leves edemas ou nódulos de até 3 cm de diâmetro no local da aplicação após a administração de 10 vezes a dose indicada, que desapareceram dentro de 3 dias.

Caso seja observado qualquer efeito sério ou outro efeito não mencionado na bula, informar o médico veterinário.

Apresentações

Frascos da fração liofilizada contendo 5 doses, 10 doses, 25 doses ou 50 doses, acompanhados de frascos de fração diluente de 10 mL (5 doses), 20 mL (10 doses), 50 mL (25 doses) ou 100 mL (50 doses), acondicionados em embalagem coletiva contendo 1, 4, 6 ou 10 frascos de cada fração.

Licenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desde 08/08/2016.
Registrado sob o número 10.193/2016.

Produto importado.

Proprietário

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein - Alemanha

Fabricante e Exportador

Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
2621 North Belt Highway
St. Joseph, Missouri 64506 - EUA

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.
Fazenda São Francisco s/n - Paulínia - SP
CNPJ: 57.600.249/0001-55
Responsável Técnica: Simone B. Zampieri
CRMV-SP nº 19.996
SAC 0800 888 7387

Bovela™ é uma marca registrada da Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, utilizada sob licença.