

Boehringer Ingelheim	AMT ING	PPM Code: 51752265 BR/5	
		SKU: 121925	
Version: 3	Date: 10.05.2023	Colors	
Product:	Mamyzin® S	Black	T
Component Type/Size:	Leaflet		
Country(s):	Brazil		
Dimensions FLAT (HxWxD):	240 x 150mm		
Dimensions FOLDED:	n.a.		
Scale/Font Size:	1:1 7.7 pt.		
Spec/Dieline #:	FIPI_150X240	Finishing/Tech Info	
Manufacturer:	CMO Haupt Latina		
Cancel and Replace:	51749116 BR/4		
Printer Notes:			

Mamyzin® S

Hidriodeto de Penetamato
Penicilina G Benetamina
Sulfato de Framicetina

USO VETERINÁRIO
**Seringa intramamária destinado ao
tratamento de vacas no período seco.**

Fórmula: Cada seringa de 5 mL contém:
Hidriodeto de Penetamato 100 mg (100.000 UI);
Penicilina G Benetamina 280 mg (280.000 UI);
Sulfato de Framicetina 100 mg.
Excipientes q.s.p. 5 mL.

PRODUTO ESTÉRIL.

Propriedades:

O tratamento com **Mamyzin®S**, durante o período seco, elimina a mastite subclínica na secagem e previne novas infecções durante o período seco.

Não ocorre nenhuma perda econômica causada pelo descarte do leite, visto que o tratamento ocorre durante o período seco.

O Hidriodeto de Penetamato é um éster de Benzilpenicilina formulado para difundir-se rapidamente no parênquima mamário, proporcionando altas concentrações de antibiótico no tecido infectado já nas primeiras 24 - 48 horas, sendo possível a erradicação imediata de infecções latentes por bactérias Gram-positivas.

A Penicilina Benetamina é um poderoso antibiótico de longa ação, que protege o úbere durante as 3 semanas mais críticas, período no qual as infecções ocorrem com maior frequência.

É particularmente efetiva contra *Streptococcus spp.* e *Corynebacterium spp.*

O Sulfato de Framicetina é um antibiótico de amplo espectro que promove uma concentração terapêutica no úbere durante todo o período seco. Este antibiótico é efetivo contra *Staphylococcus* resistentes à penicilina (*S. aureus*) e patógenos Gram-negativos, como *E. coli*, *Pseudomonas spp* e *Klebsiella spp.*

A composição de amplo espectro de **Mamyzin®S** assegura o êxito na terapia contra a mastite subclínica e incrementa a possibilidade de rentabilidade na produção leiteira.

Indicações:

O produto **Mamyzin®S** é indicado para o tratamento de mastite subclínica em vacas no período seco, em infecções causadas por *Corynebacterium bovis*, *Staphylococcus aureus*, *Estafilococos-coagulase-negativa*, *Streptococcus agalactiae* e *Streptococcus dysgalactiae*. Também foi eficaz para prevenção de novas infecções intramamárias durante o período seco de vacas leiteiras.

Posologia e modo de usar:

Administração intramamária.
Antes da infusão, o úbere deve ser ordenhado completamente, os tetos devem ser cuidadosamente limpos e desinfetados e deve-se tomar cuidado para evitar a contaminação da seringa intramamária. Aplicar o conteúdo de uma seringa de 5 mL do produto **Mamyzin®S** em cada quarto mamário, imediatamente após a última ordenha que precede o período seco. Massagear a mama para facilitar a dispersão interna do produto.

Após a infusão, os tetos devem ser mergulhados em solução antisséptica para limpeza.



51752265 BR/5

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS:

ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 9 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE - O PERÍODO DE CARÊNCIA É DE 37 DIAS APÓS O TRATAMENTO, PARA VACAS TRATADAS EM MENOS DE 35 DIAS ANTES DO PARTO. PARA VACAS TRATADAS ACIMA DE 35 DIAS ANTES DO PARTO, O PERÍODO DE CARÊNCIA É DE 36 HORAS APÓS O PARTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO HUMANO.

Advertências:

Mamyzin®S deve ser apenas utilizado em vacas secas. Não deve ser utilizado em vacas em lactação. Não utilizar o produto durante as 4 semanas que antecedem o parto.

O produto não deve ser utilizado em animais sensíveis a penicilinas.

Conservar o produto refrigerado, de 2°C a 8°C, ao abrigo da luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO

Licenciado pelo Mapa desde 22/11/1999. Registrado sob o nº SP 000023-0.000025.

Apresentação: Seringa plástica descartável com conteúdo de 5 mL, acondicionados em caixa contendo 20 seringas.

Proprietário:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Alemanha

Fabricante:

Haupt Pharma Latina S.r.l.
S.S. 156 Monte Lepini Km 47.600
04100 Borgo San Michele - Latina - Itália

Representante Exclusivo no Brasil,

Importador e Distribuidor:

Boehringer Ingelheim
Animal Health do Brasil Ltda.
Av. Doutor Roberto Moreira, 5005
Recanto dos Pássaros - Paulínia/SP
CEP: 13148-914

CNPJ: 57.600.249/0001-55

Responsável Técnica:

Simone Brainer Zampieri - CRMV-SP: 19.996
SAC: 0800 888 7387

PRODUTO IMPORTADO

51752265

